

# Vaccinations for Infants and Children, Age 0–10 Years

*Getting your child vaccinated on time will help protect him or her against 16 vaccine-preventable diseases. Ask your child's healthcare provider if your child is up to date with all recommended vaccines.*

Vaccine	Is your child up to date?
Chickenpox (varicella; Var)	Your child needs 2 doses of chickenpox vaccine. The first dose is given at 12–15 months and the second at 4–6 years.
COVID-19	Your child should receive the COVID-19 vaccine according to current CDC recommendations. The vaccine prevents the rare but serious complications of COVID-19 in children and reduces their chances of missing school due to illness.
Diphtheria, tetanus, and whooping cough (pertussis; DTaP)	Your child needs 5 doses of DTaP vaccine. The first dose is given at 2 months, the second at 4 months, the third at 6 months, the fourth at 15–18 months, and the fifth at 4–6 years.
<i>Haemophilus influenzae type b</i> (Hib)	Your child needs 3–4 doses of Hib vaccine, depending on the brand of vaccine. The first dose is given at 2 months, the second at 4 months, the third at 6 months (if needed), and the last at 12–15 months.
Hepatitis A (HepA)	Your child needs 2 doses of hepatitis A vaccine. The first dose is given at age 1 year and the second 6–18 months later.
Hepatitis B (HepB)	Your child needs 3–4 doses of hepatitis B vaccine, depending on the brand of vaccine. The first dose is given at birth, the second at 1–2 months, the third at 4 months (if needed), and the last at 6–18 months.
Human papillomavirus (HPV)	HPV vaccine is routinely given to children at age 11 or 12 years but may be started at age 9. This two-dose series should be separated by 6–12 months.
Influenza (Flu)	Everyone age 6 months and older needs influenza vaccination every fall or winter and for the rest of their lives. Some children younger than age 9 years need 2 doses. Ask your child's healthcare provider if your child needs more than 1 dose.
Measles, mumps, rubella (MMR)	Your child needs 2 doses of MMR vaccine. The first dose is given at 12–15 months and the second at 4–6 years.
Meningococcal (MenACWY [MCV4], MenB)	Infants and children age 0–10 years with certain health conditions (such as a non-functioning spleen) need one or both meningococcal vaccines. Talk with your healthcare provider to find out if your child needs meningococcal vaccination.
Pneumococcal (Prevnar [conjugate, PCV13], Pneumovax [polysaccharide, PPSV23])	Your child needs 4 doses of Prevnar (PCV13). The first dose is given at 2 months, the second at 4 months, the third at 6 months, and the fourth at 12–15 months. Some children also need a dose of Pneumovax (PPSV23). Ask your child's healthcare provider if your child needs this extra protection against pneumococcal disease.
Polio (IPV)	Your child needs 4 doses of polio vaccine (IPV). The first dose is given at 2 months, the second at 4 months, the third at 6–18 months, and the fourth at 4–6 years.
Rotavirus (RV)	Your child needs 2–3 doses of rotavirus vaccine (RV), depending on the brand of vaccine. The first dose is given at 2 months, the second at 4 months, and the third (if needed) at 6 months.

**Will your child be traveling outside the United States?** Visit the Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) website at [wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list) for travel information, or consult a travel clinic.



# Vacunas para bebés y niños de 0 a 10 años de edad

*Vacunar a su hijo de acuerdo al calendario de vacunación ayudará a protegerlo de las 15 enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Pregúntele al profesional de la salud de su hijo si está al día con todas las vacunas recomendadas.*

Vacuna	¿Su hijo está al día?
<b>Varicela (Var)</b>	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna contra la varicela. La primera dosis se coloca entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años de edad.
<b>Difteria, tétanos, y tos ferina (pertussis; DTaP)</b>	Su hijo necesita 5 dosis de la vacuna DTaP. La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses, la cuarta entre los 15 y 18 meses y la quinta entre los 4 y 6 años de edad.
<b><i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib)</i></b>	Su hijo necesita 3 a 4 dosis de la vacuna Hib, dependiendo de qué marca de vacuna le coloquen. La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses (de ser necesario) y la última entre los 12 y 15 meses de edad.
<b>Hepatitis A (HepA)</b>	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis A. La primera dosis se coloca al año y la segunda entre 6 y 18 meses después de la primera dosis.
<b>Hepatitis B (HepB)</b>	Su hijo necesita 3 a 4 dosis de la vacuna contra la hepatitis B, dependiendo de qué marca de vacuna le coloquen. La primera dosis se coloca al nacer, la segunda entre 1 y 2 meses de edad, la tercera a los 4 meses (de ser necesario) y la última entre los 6 y 18 meses.
<b>Influenza (gripe)</b>	Todas las personas de 6 meses de edad y mayores deben colocarse la vacuna contra la influenza (gripe) todos los años, en otoño o invierno, por el resto de sus vidas. Algunos niños menores de 9 años de edad pueden necesitar 2 dosis. Pregúntele al profesional de la salud de su hijo si necesita más de 1 dosis.
<b>Sarampión, paperas, rubéola (MMR)</b>	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna MMR. La primera dosis se coloca entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años de edad.
<b>Meningocócica (MenACWY [MCV4], MenB)</b>	Los bebés y niños de 0 a 10 años de edad con ciertas afecciones de salud (como por ejemplo si tienen un bazo que no funciona) se tienen que dar una o ambas vacunas contra el meningococo. Hable con su profesional de la salud para averiguar si su hijo necesita una vacuna meningocócica.
<b>Neumocócica (Prevnar [vacuna conjugada, PCV], Pneumovax [vacuna polisacárida, PPSV])</b>	Su hijo necesita 4 dosis de la vacuna Prevnar (PCV). La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta entre los 12 y 15 meses de edad. Algunos niños necesitan además una dosis de la vacuna Pneumovax (PPSV). Pregúntele al profesional de la salud de su hijo si necesita esta protección adicional contra la enfermedad neumocócica.
<b>Polio (IPV)</b>	Su hijo necesita 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis (IPV). La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera entre los 6 y 18 meses y la cuarta entre los 4 y 6 años de edad.
<b>Rotavirus (RV)</b>	Su hijo necesita 2 a 3 dosis de la vacuna contra el rotavirus (RV), dependiendo de qué marca de vacuna le coloquen. La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, y la tercera a los 6 meses (de ser necesario).

**¿Su hijo va a viajar fuera de los Estados Unidos?** Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, o CDC) en [wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list) para información para viajeros, o consulte una clínica para viajeros.